EXPRESIÓN DE GENES de diferenciación de *Bacillus thuringiensis* EN CULTIVOS DE SUPERFICIE.

Daniel Pérez-Solís¹, Francisco Figueroa-Martínez², Ernesto Favela-Torres², Jorge Rocha-Estrada³, Itzamná Baqueiro-Peña⁴, Mayra de la Torre-Martínez⁴, Gustavo Viniestra-González², ¹Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Ciudad de México, 09340. ²CIDEA-CONACYT, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, 42162 ³CIAD, Hermosillo, Sonora, 83304 vini@xanum.uam.mx.

Palabras clave: Diferenciación en bacterias, cultivo superficial, heterogeneidad génica.

Introducción. La diferenciación celular de *Bacillus* está controlada por un conjunto de genes reguladores que conllevan cambios en su expresión genética¹. En *Bt*, la regulación de genes de diferenciación es poco conocida pero su entendimiento podría ser clave para optimizar los rendimientos de esporas y toxinas Cry. El uso de cultivos superficiales, es una alternativa para evaluar la diferenciación de *Bt*, por su fácil manejo en el laboratorio y sus posibles aplicaciones biotecnológicas. El objetivo de este trabajo es evaluar la expresión de genes de esporulación, biofilms, virulencia y necrotrofismo, a través de cepas reporteras con fusiones transcripcionales, determinar las subpoblaciones que entran en los diferentes procesos de diferenciación.

Metodología. Las regiones promotoras de genes de esporulación (*spolIA*, *sspB*), virulencia (*cry1ac*), biofilms (*sipW*, *sinI*) y necrotrofismo (*nprA*) se eligieron del genoma de *Bt* HD73 por medio del programa Artemis. Se diseñaron cebadores específicos para cada región promotora. La secuencia codificante de *gfp* fue amplificada del vector pMutin-*gfp*. Cada región promotora seleccionada fue ligada con el gen *gfp*, usando el método de Gibson². Posteriormente estas construcciones fueron ligadas al vector pHT315 y cada una transformada en *E. coli* TOP 10, y posteriormente a *Bt* HD73. Como resultado, se obtienen cepas de *Bt* HD73 reporteras, para la expresión de cada uno de los genes seleccionados, así como 2 cepas control, un control positivo (fusión constitutiva (P_{spac}'*gfp*) y negativo (vector vacío). Con estas cepas se llevaron a cabo fermentaciones en cultivo superficial en tubos para centrifuga con medio *clean*³ solidificado con agar, con 10 g/L de glucosa y una relación C/N= 5.1 Se evaluó el crecimiento y esporulación de *Bt* por medio de UFC totales y termorresistentes. La expresión relativa de los promotores con el gen reportero *gfp* de cada cepa fue evaluada por medio de un citómetro de flujo⁴.

Resultados. Todas las cepas reporteras de *Bt* presentaron el mismo patrón de crecimiento que se describe en la Fig. 1. Se observó un punto máximo de crecimiento vegetativo y aparición de esporas a las 24 h. Se observó menos del 30 % de esporas libres en el máximo punto de esporulación (120 h). Con respecto a nuestros controles, la construcción pHT315 no presentó fluorescencia, ya que el vector, no tiene clonado ninguna construcción, mientras que la expresión de la construcción

P_{spac}'*gfp*, se mantuvo constante durante toda la cinética. La expresión de la construcción P_{spolIA}'*gfp*, se empieza apropiadamente a la h 16, un par de horas antes que se observen la aparición de esporas, además se observa que su expresión se origina de manera ascendente, del mismo modo que las esporas (Tabla). La construcción P_{nprA}'*gfp*, se expresa en un alto porcentaje de células en cultivo superficial. La construcción P_{sipW}'*gfp*, se expresa en una subpoblación grande durante toda la fermentación y esto se atribuye a que el cultivo superficial propicia la formación de biopelículas sobre sustratos sólidos⁴.

Fig. 1. Cinética de *Bt* en cultivo superficial (Bacilos y esporas). Los datos corresponden a la construcción P_{spolIA}'*gfp*

Tabla 1. Porcentaje de células fluorescentes que expresan *gfp*, durante la cinética en cultivo superficial

Tiempo (h)	spolIA %	P _{spac} %	nprA %	Sipw %
8	2.5±1.5	37.2±20.2	0.9±0.4	7.0±10.4
16	27.5±8.2	96.7±2.7	76.9±10.1	66.4±7.4
24	32.7±14.3	97.0±1.1	56.1±3.0	60.4±3.8
36	44.2±9.5	89.8±2.5	30.1±3.9	73.9±3.2
48	15.6±3.8	85.1±4.6	26.2±3.5	77.3±3.7
72	58.3±5.5	89.1±3.0	75.0±2.7	78.0±2.0
96	60.4±12	82.3±2.9	73.4±1.8	69.5±4.0
120	65±13.2	90.1±1.4	58.2±16.3	79.8±0.2

Conclusión. El soporte estructural del cultivo superficial propicia que los genes relacionados a la formación de biopelículas se expresen en una subpoblación grande, y probablemente la formación de biopelículas simultáneamente genera heterogeneidad genética, lo que origina que un mismo cultivo coexistan células formadoras de esporas, y necrotrofas.

Referencias

1. Vlamakis, H., Aguilar, C., Losick, R., y Kolter, R. (2008). *Genes Dev.* 22(7), 945–953.
2. Gibson G., Young L., Chuang Y., Venter C., Hutchison A., y Smith O. (2009). *Nat. Methods*, 6, 343-345.
3. Dinorin, J., Delgado, J., Corona, L. Montes, M., de la Torre, M., y López, E. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 99(13), 5439-5450.
4. Verplaetse, E., Slamti, L., Gohar, M., y Lereclus, D. (2015). *mBio*, 6(3), 1–10.